



كبسولات جيلاطينية صلبة و أكياس بودرة لعمل معلق

الاسم العلمي:

كيسولات جيلاتينية صلبة: اومبيرازول ٢٠ أو ٤٠ مجم + صوديوم بيكربونات ١١٠٠ مجم.  
أكياس (كل كيس يحتوى على ٦ جرام بودرة لعمل معلق): اومبيرازول ٢٠ مجم أو ٤٠ مجم + صوديوم بيكربونات ١٦٨٠ مجم.

### الشكل الصيدلي:

- داونوبرازول ٢٠ مجم و ٤٠ مجم كيسولات جيلاتينية صلبة.  
داونوبرازول ٢٠ مجم و ٤٠ مجم أكياس كل كيس يحتوى على ٦ جرام بودرة لعمل معلق ماهي أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن داونوبرازول؟

- قد يساعد داونوبرازول على تحسين الأعراض المرتبطة بحمض المعدة ماهو داونوبرازول؟

داونوبرازول هو من الادوية التي تحتوي علي مشببات مضخة البروتون حيث يقلل من كمية الحمض الموجود في المعدة و التهاب المعدة وارتجاع المريء وقرحة المعدة والتقليل من خطر نزيف المعدة وارتجاع المريء الليلي وجرثومه المعدة يستخدم داونوبرازول مع البالغين:

- لمدة ٤ أسابيع لعلاج قرحة الاثني عشر. قد يصف الطبيب ٤ أسابيع أخرى من العلاج بداونوبرازول.
- لمدة تصل إلى ٨ أسابيع لعلاج قرحة المعدة.
- لمدة تصل إلى ٤ أسابيع لعلاج حرقان فم المعدة والأعراض التي تحدث مع إرتجاع عصاره المعدة إلى المريء الذي من أعراضه الشعور بحرقان في الصدر أو الحلق، وإفسادالتذوق أو التجشؤ.
- لمدة تصل إلى ٨ أسابيع للشفاء من الأضرار الناتجة عن تآكل بطانة المريء بسبب حمض المعدة (ويسمى التهاب المريء التآكلي) حيث يستخدم للمساعدة علي التأم بطانة المريء المتآكلة.
- لتقليل النزيف بالمعدة في المرضى ذوي الحالات الحرجة (داونوبرازول ٤٠ مجم معلق فقط)

### كيفية تناول داونوبرازول

- تناول داونوبرازول كما وصفه لك الطبيب.
- لا تغيير الجرعة أو توقف تناول داونوبرازول دون التحدث مع طبيبك. تناول داونوبرازول على الريق قبل وجبة الطعام بساعة واحدة على الأقل.
- أفرغ محتويات الكيس في كوب يحتوى على ١-٢ ملعقة كبيرة من الماء (لا تستخدم سوائل أخرى أو طعام) قلبها جيدا ثم تناولها فوراً. أمتلأ الكوب مرة أخرى بالماء وتناوله.
- تبلع الكبسولة مع الماء ولايستخدم أي سائل اخر. لا تفتح الكبسولة وتفرغ محتوياتها على الطعام.
- اذا نسيت جرعه فتناولها عند تذكرها
- اذا كان وقت تذكر الجرعه هو تقريبا وقت تناول الجرعة التالية فلا تتناول الجرعه الفائتة وتناول الجرعة التاليه في الوقت المخصص لها، لا تأخذ جرعتين لتعويض الجرعة المنسية.
- لا تتناول كبسولتين من داونوبرازول ٢٠ مجم بدلا من كبسولة واحدة ٤٠ مجم، لأنك بذلك سوف تتناول ضعف كمية بيكربونات الصوديوم .
- لا تتناول كيسين من داونوبرازول ٢٠ مجم بدلا من كيس واحد ٤٠ مجم، لأنك بذلك سوف تتناول ضعف كمية بيكربونات الصوديوم .

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

- داونوبرازول ٢٠ مجم ، ٤٠ مجم كيسولات جيلاتينية صلبة: يحفظ في مكان جاف في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.

ماهي مكونات داونوبرازول ؟

### التركيب:

تحتوي كل كبسولة جيلاتينية صلبة على :  
مواد فعالة :

اومبيرازول ٢٠ أو ٤٠ مجم.  
صوديوم بيكربونات ١١٠٠ مجم.

يحتوى كل كيس ٦ جرام بودرة لعمل معلق على انمواد فعالة:  
اومبيرازول ٢٠ مجم أو ٤٠ مجم .  
صوديوم بيكربونات ١٦٨٠ مجم.

يمكن تعاطي داونوبرازول معلق عن طريق الأنبوبة المعدية الفموية أو الأنفية و يحضر المعلق في ٢٠ مل ماء ويقلب جيدا ثم يتناول فوراً (لا تستخدم سوائل أخرى أو طعام) ويجب استخدام سرنجة مناسبة لإدخال المعلق داخل الأنبوبة وبعد ذلك يمرر في الأنبوبة ٢٠ مل ماء لغسل المعلق.

#### العبوة:

داونوبرازول ٢٠ او ٤٠ مجم كبسولات جيلاتينية صلبة: علبة كرتون تحتوي على شريط ١٤ كبسولة جيلاتينية صلبة + نشرة داخلية.

داونوبرازول ٢٠ مجم أو ٤٠ مجم أكياس: علبة كرتون تحتوي على ٧ أكياس ، يتكون الكيس ٦جم بودرة لعمل معلق + نشرة داخلية.

: