



دولوكسبرين ٣٠ مجم & ٦٠ مجم

كبسولات جيلاتينية صلبة ذات كسوة معدية
دولوكستين هيدروكلورايد ٣٠ مجم
دولوكستين هيدروكلورايد ٦٠ مجم

١- ما هو دولوكسبرين وما هو استخدامه

يحتوى دولوكسبرين على المادة الفعالة دولوكستين . يعمل دولوكسبرين على زيادة مستويات السيروتونين ونورادرينالين فى الجهاز العصبى .

يستخدم دولوكسبرين فى علاج :

- ١- الاكتئاب.
- ٢- القلق والاضطرابات النفسية (الشعور المزمن بالقلق أو العصبية)
- ٣- الآلام العصبية التي تحدث مع مرضى السكر (مثل الشعور بالحرقان والوخز والسع والحكة أو الشعور كمن صدم كهربائياً وقد يفقد الشعور بالاحساس بالمناطق المصابة أو يكون هناك احساس باللمس أو الحرارة أو البرودة أو بالضغط مما يسبب ألم).

يبدأ تأثير دولوكستين لدى معظم الاشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أو القلق في غضون أسبوعين من بدء العلاج،

في الأشخاص الذين يعانون من آلام الاعتلالى العصبى السكري قد يستغرق ذلك بعض أسابيع قبل شعورهم بتحسن. تحدث إلى طبيبك إذا لم تشعر بتحسن بعد شهرين من العلاج..

٤- كيفية تناول دولوكسبرين:

- التزم دائماً بالجرعات التي وصفها لك طبيبك أو الصيدلى.
- إستشر طبيبك أو الصيدلى إذا لم تكن متأكد.
- يجب تناول دولوكسبرين عن طريق الفم. يجب ابتلاع الكبسولة كاملة مع الماء.
- للإكتئاب والالام الاعتلالى العصبى السكرى: الجرعة المعتادة من دولوكسبرين ٦٠ مجم مرة واحدة فى اليوم، سيفى لك طبيبك الجرعة المناسبة لحالتك.

- القلق والاضطرابات النفسية: في المعتاد تبدأ جرعة دولوكسيرين من ٣٠ مجم مرة واحدة في اليوم ويعد ذلك تزييد لتصبح ٦٠ مجم مرة واحدة في اليوم، سوف يصف لك طبيبك الجرعة المناسبة لحالتك. يمكن ضبط الجرعة حتى ١٢٠ مجم في اليوم حسب استجابتك لدولوكسيرين.
- لتفادي نسيان جرعة دولوكسيرين يفضل تناولها في نفس الوقت كل يوم.
- تحدث مع الطبيب عن مدة العلاج ب دولوكسيرين. لا توقف الدواء أو تغيير الجرعة بدون الرجوع الى الطبيب. إن علاج الأضطراب الذي تعاني منه بشكل صحيح مهم لمساعدتك على التحسن. إذا لم يتم علاجك قد لا يشفى مرضك وقد يصبح أكثر خطورة ويصعب علاجه.

عند نسيان أخذ الجرعة يلزم أخذها عند تذكرها ، إذا تذكرت في ميعاد الجرعة التالية لا يلزم مضاعفة الجرعة. إذا توقفت فجأة عن تناول دولوكسيرين : لا توقف الدواء من تلقاء نفسك دون الرجوع إلى الطبيب حتى إذا شعرت بتحسن.

إذا رأى الطبيب أن الحالة لم تعد بحاجة إلى تناول دولوكسيرين سوف يطلب منك تقليل الجرعة تدريجياً على مدى اسبوعين على الأقل قبل إيقاف العلاج تماماً.

٥- كيفية حفظ دولوكسيرين

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

يحفظ في مكان جاف في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.

دولوكسيرين هو كبسولات جيلاتينية صلبة ذات كسوة معدية يحتوى على حبيبات دولوكستين هيدروكلورايد ذات كسوة تحميها من الحامض المعدى.

العبوة:

علبة تحتوى على ٢ أوشريط (المونيوم/ بي فى دى سى) كل شريط ١٤ كبسولة جيلاتينية صلبة + نشرة داخلية.