



نانازوكسيد (نيتازوكسانيد) أقراص ٥٠٠ مجم

نانازوكسيد (نيتازوكسانيد) بودرة لعمل معلق يتناول عن طريق الفم ١٠٠ مجم/ ٥ مللي

الوصف

نانازوكسيد معلق أو أقراص يحتوي على مادة فعالة تسمى نيتازوكسانيد وهو مطهر معوي مضاد للطفيليات يؤخذ عن طريق الفم .

نانازوكسيد أقراص تحتوي على نيتازوكسانيد ٥٠٠ مجم

نانازوكسيد معلق يؤخذ عن طريق الفم وذلك بعد إضافة ٤٨ مللي من الماء ليصل الى ٦٠ مللي بعد التحضير حيث يحتوي كل ٥ مللي على نيتازوكسانيد ١٠٠ مجم وما يلي المواد الغير فعالة: سكروز- نشا - حمض الستريك الامائي- أفيسيل - صمغ زنتان- بنزوات الصوديوم- ايروسيل- ارثروزين- نكهة الفراولة .

دواعي الاستعمال:

يستخدم نانازوكسيد في علاج حالات الإسهال الناتج عن العدوى بطفيل الجيارديا لامبيليا و طفيل كريبتوسبورديم بارفم :

نانازوكسيد معلق يستخدم مع الاطفال من عمر ١ سنة وكبار السن.
ونانازوكسيد أقراص مع المرضى من عمر ١٢ عاما وما فوق .

تعليمات للمريض:

ينبغي تناول نانازوكسيد مع الطعام.
نانازوكسيد معلق يحتوي على سكروز كمادة غير فعالة ولذلك يلزم توخي الحذر مع مرضى الداء السكري .
إذا كان لديك حساسية لبعض أنواع السكر، اتصل بالطبيب قبل تناول هذه الدواء .

الجرعة وطريقة الاستعمال:



الجرعة	السن	الاستخدام
٥ مللى كل ١٢ ساعة لمدة ٣ أيام مع الطعام	من سنة حتى ٣ سنوات	لعلاج الاسهال الناتج عن الاصابة ب جيارديا لامبلييا وكربتوسبورديوم بارفم
١٠ مللى كل ١٢ ساعة لمدة ٣ أيام مع الطعام	من ٤ سنوات حتى ١١ سنة	
٢٥ مللى شراب (قرص نانازوكسيد ٥٠٠ مجم) كل ١٢ ساعة مع الطعام	من ١٢ سنة فأكبر	

يحتوى القرص الواحد من نانازوكسيد على كمية نيتازوكسانيد أعلى من الجرعة الموصى بها للأطفال سن ١١ سنة أو أقل.

العبوة:

- نانازوكسيد ٥٠٠ مجم أقراص: عليه كرتون تحتوى على ٣ شرايط كل شريط ٦ أقراص + نشرة داخلية .
- نانازوكسيد بودرة لعمل معلق: علبة كرتون بها زجاجة تحتوى على بودره لعمل ٦٠ مل معلق بعد التحضير + معيار مدرج + نشرة داخلية.

التخزين :

- يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال .
- نانازوكسيد ٥٠٠ مجم أقراص: يحفظ في مكان جاف في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية.
- نانازوكسيد بودرة لعمل معلق: يحفظ فدرجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية وبعد التحضير يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى ٣٠ درجة مئوية لمدة اسبوع